


Буклет «Внебольничная пневмония»



Автор:
старший воспитатель
Сенина Юлия Михайловна

607511, Нижегородская область,
г. Сергач, ул. Ульянова д.212 а.
detskiisad.rucheeek-15@mail.ru
Сайт: <http://sad15-rycheek.ucoz.ru/>

2020 г

Профилактика внебольничной пневмонии

Основная форма профилактики — это вакцинация, проводится с пневмококковой и антигриппозной вакцинами. Возможен одномоментный ввод двух вакцин сразу, но в разные руки. Для этого используют двадцатитрехвалентную неконъюгированную вакцину, вводят в дельтовидные мышцы рук. Прививаться необходимо до холодов. Выборка к обязательной вакцинации включает: пожилых людей, при наличии хронизирующих процессов легких и сердца, детей, беременных, медицинский персонал и сиделок, членов семей группы риска. Профилактирование внебольничной пневмонии заключается в правильном здоровом режиме отдыха и труда, исключении пагубных пристрастий, показана физическая и спортивная активность, пешие прогулки, сбалансированное питание, следует избегать переохлаждений, сквозняков, перегревов, должна проводиться частая уборка жилья, личная гигиена, ограничение контактирования с вирусными больными. Если же человек заболел, необходимо своевременно посетить врача без отягощающих попыток самолечения.

Источник:
<https://vlanamed.com/vnebolnichnaya-pnevmoniya/> Энциклопедия Заболеваний ©

Симптоматический комплекс внебольничной пневмонии:

Принято разделять посиндромно:

- синдром поражения легочной ткани (дыхательная недостаточность), интоксикационный синдром,
- астено-вегетативный синдром. Они тесно переплетены и проявляются: — Проявления в виде мигреней, понижения аппетита, ночная сильная потливость, синюшность кожи — чаще цианоз в области носогубного треугольника, нередко загрудинные боли на вдохе-выдохе, покалывания в правом подреберье, усиливающиеся при вдыхании воздуха, гипертермия 38.0 — 39.9°C.
- Кашель сухой или постоянное покашливание, далее продуктивный, выделяется обильная гнойно-слизистая, вязкая или жидкая, мокрота, возможно присутствие прожилок крови.

По степени тяжести симптомокомплексу характерно:

- В лёгкой форме — непродолжительно проявляющаяся одышка, но возникающая при нагрузках, субфебрилитет, АД в норме, ясность сознания.
- Средняя тяжесть внебольничной пневмонии — тахикардия, потливость, лихорадка, лёгкая эйфория.
- Признаки тяжёлой формы — недостаточность дыхания, которая требует оксигенотерапии или искусственной поддержки, септический шок, бредовое состояние сознания.

Источник: <https://vlanamed.com/vnebolnichnaya-pnevmoniya/> Энциклопедия Заболеваний ©

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Существует классифицирование внебольничной пневмонии, зависимо от влияющих факторов: — Выделяют степени тяжести внебольничной пневмонии, по величине очага, наличия отягощающих признаков, физикальных данным:

- Легкая степень – самая обширная группа, лечится в домашних условиях, под динамичным наблюдением врача, нет крайней необходимости в госпитализации (летальность 1-5%).
- Степень средней тяжести – ее особенность, наличие у больных данной группы хронических заболеваний, лечится в терапевтическом отделении, так как эта мера направлена на скорейшее выздоровление и недопустимость хронизации (смертность 12%).
- Тяжелую степень ведут только в стационарных стенах — ПИТ или ОРИТ при особо опасных проявлениях болезни (смертность 40%). — Также разделяют на несколько типов зависимо от механизма развития: первичную, вторичную, аспирационную, посттравматическую, тромбоэмболическую. — Зависимо от сопутствующих факторов, внебольничная пневмония может протекать с осложнениями или в неосложненной форме. — Возбудитель внебольничной пневмонии дифференцирует болезнь на следующие виды: *бактериальные, хламидийные, микоплазменные, вирусные грибковые, смешанные.*

Источник: <https://vlanamed.com/vnebolnichnaya-pnevmoniya/> Энциклопедия Заболеваний ©

Внебольничная пневмония!

Внебольничная пневмония — что это такое? Внебольничную пневмонию смело можно назвать одной из всемирно самых распространенных болезней органов дыхания, повсеместная заболеваемость составляет 15 человек на 1000 населения в год. Точный уровень трудно регистрируем, так как имеется низкий показатель обращаемости за врачебной помощью. Затрагивает болезнь всех, независимо от гендерной принадлежности и возраста, от географической зонации, социально-экономических нюансов и климатических условий. Большая предрасположенность существует у старшей возрастной категории лиц от 67 лет и дошкольников, ежегодно болеет 25 — 45 людей на 1000. Так в домах престарелых из-за возраста и узкого круга общения, малой мобильности болеет 70 — 115 человек на тысячу.



Источник:

<https://vlanamed.com/vnebolnichnaya-pnevmoniya/> Энциклопедия Заболеваний ©